



LANNATE 25 WP

INSETICIDA

1 Kg

A PROTEÇÃO IMEDIATA!

Formulação: Pó molhável em bolsas hidrossolúveis com 25% de metomil

Grupo químico: Carbamato

AV: 0430

Classificação DPD:

Tóxico; Perigoso para o ambiente

Classificação CLP: PERIGO



Classificação ADR: UN 3016

Documento de Transporte - UN 2757, CARBAMATO PESTICIDA SÓLIDO, TÓXICO, (Contém Substância activa), 6,1, II, 2 (D/E)N 3016, PESTICIDA BIPIRIDÍLICO LÍQUIDO, TÓXICO, (Contém metomil), 6,1, II, 2 (D/E)

Características

O LANNATE® 25WP é um inseticida com base em metomil, substância ativa pertencente ao grupo químico dos carbamatos (Grupo 1A do IRAC – Inibidores da acetilcolinesterase).

Inseticida sistémico que atua por contacto e ingestão ao nível do sistema nervoso por inibição da acetilcolinesterase, com potente efeito de choque. Detém ação ovicida, larvicida e adulticida, controlando as pragas nas várias fases de desenvolvimento. Permite o controlo de insetos picadores sugadores não atingidos diretamente pela pulverização, mesmo em situações de enrolamento foliar.

Condições de Aplicação

CULTURA	PRAGA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
TOMATEIRO PIMENTEIRO E BERINGELA (ar livre)	Lagartas (<i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Autographagamma</i> , <i>Chrysodeixis chalcites</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i> , <i>Spodoptera</i> spp.), Traça do tomateiro (<i>Tuta absoluta</i>), Mosca-branca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> e <i>Bemisia tabaci</i>), Larva mineira (<i>Liriomyza sativae</i>) e Afídeos (<i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	1 Kg/ha	Em aplicações realizadas em alto volume ter em consideração que a dose indicada (1 kg/ha) não deverá ser excedida. Aplicar o produto na parte aérea das plantas. Repetir os tratamentos em caso de necessidade, não efectuando mais de 2 aplicações com um intervalo entre ambas de 10-14 dias.	7 dias
PEPINO, COURGETTE, MELÃO, MELANCIA E ABÓBORA (ar livre)	Lagartas (<i>Autographa gamma</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> , <i>Mythimna unipuncta</i> , <i>Spodoptera</i> spp.), Afídeos (<i>Aphis gossypii</i>) e Mosca- branca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1Kg/ha	Em aplicações realizadas em alto volume ter em consideração que a dose indicada (1 kg/ha) não deverá ser excedida. Aplicar o produto na parte aérea das plantas. Repetir os tratamentos em caso de necessidade, não efectuando mais de 2 aplicações com um intervalo entre ambas de 10-14 dias.	7 dias em pepino e courgette e 14 dias em melão, melancia e abóbora

CULTURA	PRAGA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
TABACO	Lagartas (<i>Helicoverpa armigera</i>) e Afídeos (<i>Myzus nicotianae</i> , <i>Macrosiphumeuphorbiae</i>)	1Kg/ha	Em aplicações realizadas em alto volume ter em consideração que a dose indicada (1 kg/ha) não deverá ser excedida. Aplicar o produto na parte aérea das plantas. Repetir os tratamentos em caso de necessidade, não efectuando mais de 2 aplicações com um intervalo entre ambas de 10-14 dias.	21 dias

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

metomil – 0,02 em tomate e beringela; 0,1 em abóbora, courgette, pimento, melão e melancia.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.