



WINNER TOP

HERBICIDA

1L/5L

PÓS-EMERGÊNCIA COM EFEITO RESIDUAL

Formulação: Dispersão em óleo com 16,75 g/l ou 1,7% (p/p) de nicossulfurão e 250 g/l ou 25,4% (p/p) de terbutilazina

Grupo químico: Sulfonilureia e 1,3,5-triazina

APV: 3903

Classificação DPD:

Nocivo; Perigoso para o ambiente

Classificação ADR: UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém nicossulfurão e terbutilazina), 9, III, 3 (E)

Classificação CLP: ATENÇÃO



Características

O **Winner Top** é um herbicida residual e sistémico, absorvido pelas folhas e pelas raízes, indicado para aplicação em pós-emergência da cultura do milho (4-6 folhas), com as infestantes com 3-5 folhas, para controlo de infestantes anuais gramíneas e dicotiledóneas.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Beldroega (*Portulaca oleracea*), bredos (*Amaranthus* spp.), cabelo-de-cão (*Poa annua*), erva-febra (*Lolium rigidum*), erva-moira (*Solanum nigrum*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), malvão (*Abutilon theophrasti*), margaça (*Chamaemelum mixtum*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), morrião (*Anagallis arvensis*), quenopódios (*Chenopodium* spp.), labças (*Rumex* spp.), saramago (*Raphanus raphanistrum*), milhã-verde (*Setaria viridis*), pega-saias (*Setaria verticillata*), milhã-amarelada (*Setaria pumila*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*), sorgo-bravo (*Sorghum halepense*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS

Mal-casada (*Polygonum lapathifolium*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*)

INFESTANTES RESISTENTES

Junça-de-conta (*Cyperus rotundus*), juncinha (*Cyperus esculentus*), grama (*Cynodon dactylon*), corriola (*Convolvulus arvensis*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvensis*), graminhão (*Paspalum paspalodes*).

Condições de Aplicação

CULTURA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
MILHO	2,5 - 3 L/ha	Aplicar quando a cultura tiver 4-6 folhas e as infestantes não tenham mais de 3-5 folhas. Utilizar a dose mais baixa para infestantes mais susceptíveis e/ou em solos ricos em matéria orgânica. Efectuar uma única aplicação anual. Para uma aplicação uniforme o solo deve estar bem preparado e com humidade suficiente à superfície; se necessário, efectuar uma rega ligeira nas 12 horas após a aplicação, a não ser que se preveja chuva nos dias seguintes. Não se deve mobilizar o solo após a aplicação.	—

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

nicossulfurão – 0,01 em milho. terbutilazina – 0,1 em milho

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.