



**selectis**

AQUI À MÃO

[www.selectis.pt](http://www.selectis.pt)



Edição I-G-2020

# PROTEÇÃO DA BATATA SOLUÇÕES SELECTIS

**selectis**  
AQUI À MÃO

# SOLUÇÕES SELECTIS PARA A PROTEÇÃO DA CULTURA DA BATATA


FINALIDADE	PRODUTO	COMPOSIÇÃO	MODO DE AÇÃO	IS (DIAS)	DOSE/ CONCENTRAÇÃO
Infestantes	<b>XISTO 330</b>	330 g/L de pendimetalina (SC)	residual	-	3 a 6 L/ha
	<b>MONARK 125 EC</b> <small>NOVO</small>	125 g/L de fluazifope-P-butilo (EC)	sistémico e selectivo	90	2 L/ha
	<b>QUIZOPE</b> <small>NOVO</small>	120 g/L de quizalofope-P-etilo (EC)	sistémico e selectivo	56	0,83 a 1,25 L/ha
Míldio	<b>MILTRIPLO</b>	3% de cimoxanil + 12,5% de folpete + 12,5% de mancozebe (WP)	penetrante e contacto	7	4 Kg/ha
	<b>CRUZADO MZ</b>	64% de mancozebe + 8% de metalaxil (WP)	sistémico e contacto	14	2,5 Kg/ha
	<b>OXFORD</b>	90 g/L de dimetomorfe + 419g/L de propamocarbe (SC)	sistémico, penetrante e contacto	21	2 L/ha
	<b>BOLTEX C</b> <small>NOVO</small>	215 g/L de cobre (hidróxido) + 28 g/L de metalaxil-M (SC)	sistémico e contacto	21	350 g/hL
	<b>SENADOR MZ</b>	7,5% de dimetomorfe + 66,7% de mancozebe (WG)	penetrante e contacto	21	2,5 Kg/ha
	<b>MILGOLD PRO*</b>	30% cimoxanil + 22,5% famoxadona (WG)	penetrante e contacto	14	400 g/ha
	<b>CIMORAME M</b>	4% de cimoxanil + 46,5% de mancozebe (WP)	penetrante e contacto	7	3 Kg/ha
	<b>CIMONIL C</b>	4% de cimoxanil + 40% de oxicloreto de cobre (WP)	penetrante e contacto	7	3 Kg/ha
	<b>MANCOZEBE SELECTIS</b>	80% de mancozebe (WP)	contacto	7	2 Kg/ha
	<b>MILTANE MICRO</b>	75% de mancozebe (WG)	contacto	7	210 g/hL
	<b>CALDA BORDALESA SELECTIS</b>	20% de cobre (sob a forma de sulfato de cobre e cálcio) (WP)	contacto	7	1,25 a 2,25 Kg/hL
Alternariose	<b>MANCOZEBE SELECTIS</b>	80% de mancozebe (WP)	contacto	7	2 Kg/ha
	<b>MILTANE MICRO WG</b>	75% de mancozebe (WG)	contacto	7	210 g/hL
Escaravelho da Batateira	<b>ATLAS</b>	Micro-encapsulado com 100 g/L de lambda-cialotrina (CS)	contacto e ingestão	7	150 a 200 mL/ha
	<b>PETRA</b>	25 g/L de deltametrina (EC)	contacto e ingestão	7	300 a 500 mL/ha
Dessecante	<b>SHARK</b>	60g/L de carfentrazona-etilo (ME)	contacto não seletivo	3	1 L/ha
Molhante	<b>ABION E</b>	346 g/L de parafina (EW)	-	-	200 mL/ha
Traça da Batateira	<b>AVAUNT</b> <small>NOVA FINALIDADE</small>	150 g/L de indoxacarbe (EC)	contacto e ingestão	14	25 mL/hL
	<b>JACKPOT</b>	Pó polvilhável com 0,1% (p/p) de deltametrina (DP)	contacto e ingestão	-	750 g por 1000 kg de batata

\* Fungicidas com ação complementar sobre a alternariose

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Deverá calibrar-se o equipamento de acordo com o volume de calda a aplicar por hectare. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações e as doses indicadas.

Conheça corretamente o débito do pulverizador (L/min), a velocidade de avanço e a largura de trabalho da barra de pulverização. Efetue os cálculos necessários para que seja possível cumprir as doses de produto fitofarmacêutico a aplicar por hectare. Para que seja possível a uniformidade da distribuição da calda tenha especial atenção à uniformidade do débito de cada bico de pulverização.



\* Fungicida com efeito complementar sobre alternariose  
\*\* Inseticidas não homologados mas com efeito complementar no controlo da traça  
UTILIZE OS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS DE FORMA SEGURA. LEIA SEMPRE O RÓTULO E A INFORMAÇÃO RELATIVA AO PRODUTO ANTES DE O UTILIZAR.