GAMA DE FITONUTRIENTES SELECTIS PARA A NUTRIÇÃO DA VINHA

FINALIDADE	PRODUTO	COMPOSIÇÃO	DOSE
Fitonutrientes	**AMINOVITAL**	Solução com 112 g/L de Aminoácidos livres e 48 g/L de Azoto (SL)	100 a 200 mL/hL
	BOROFORCE	Solução com 150 g/L de Boro forma de etanolamina (B) (SL)	100 a 150 mL/hL
	CALCIFLOW	Suspensão concentrada com 554 g/L de Cálcio (CaO) (SC)	100 a 150 mL/hL
	PROFRUTA K	Solução com 475 g/L de Potássio (K2O); 46 g/L de Azoto e 15 g/L de EDTA (SL)	200 a 300 mL/hL

CROP EXPERT

selectis

AQUI À MÃO

www.selectis.pt

CERTIFICAÇÃO apcer
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
NP 4457

PROTEÇÃO DA VINHA
SOLUÇÕES SELECTIS

selectis

AQUI À MÃO

FINALIDADE	PRODUTO	COMPOSIÇÃO	MODO DE AÇÃO	IS (DIAS)	DOSE/ CONCENTRAÇÃO
Infestantes	ALIADO	40 g/L de diflufenicão + 160 g/L de glifosato (SC)	sistémico e residual não seletivo	n.a.	6 a 8 L/ha
	DAKAR PLUS	240 g/L de oxifluorfena (EC)	contacto e redidual não seletivo	n.a.	0,6 L/ha
	MARQUI	360g/L de glifosato (SL)	sistémico não seletivo	28	2 a 10 L/ha
	MONARK 125 EC	125 g/L de fluazifope-P-butilo (EC)	sistémico e seletivo	7-90	2 a 3 L/ha
	ORFEU	250 g/kg de flazassulfurão (WG)	sistémico, contacto e residual não seletivo	n.a.	60 a 200g/ha
	QUIZOPE NOVO	120 g/L de quizalofope-P-etilo (EC)	sistémico e selectivo	35	0,83 a 1,25 L/ha
	SHARK	60g/L de carfentrazona-etilo (ME)	contacto não seletivo	21	0,3 L/ha
Formas hibernates de insectos e ácaros	KLIK EXTRA	790 g/L de óleo parafínico (EC)	contacto	-	1,75 a 2,5 L/hL
Escoriose	ALASKA MICRO	80% de enxofre (WG)	contacto e libertação de vapores	-	400 a 500 g/hL
	TAGUS F	7,36% de azoxistrobina + 39,37% de folpete (SC)	penetrante e contacto	28*	150 mL/hL
Míldio	BELVITIS	6% de dimetomorfe + 25% de folpete + 50% de fosetil-alumínio (WG)	sistémico, contacto e anti-esporulante	28	300 g/hL
	BOLTEX C NOVO	215 g/L de cobre (hidroxido) + 28,5 g/L de metalaxil-M (SC)	sistémico, contacto e anti-esporulante	28	350 ml/hL
	BORDALESA SELECTIS 124 EC NOVO	124 g/L de cobre (na forma de sulfato de cobre e cálcio) (SC)	contacto	21	600 mL/hL
	CALDA BORDALESA SELECTIS	20% de cobre (sob a forma de sulfato de cobre e cálcio) (WP)	contacto	7	1,25 a 2 Kg/hL
	CIMAZUL	4% de cimoxanil + 46,5% de mancozebe (WP)	penetrante e contacto	Obs 1	300 g/hL
	CIMONIL C	4% de cimoxanil + 40% de cobre (WP)	penetrante e contacto	21	300 g/hL
	CIMORAME M	4% de cimoxanil + 46,5% de mancozebe (WP)	penetrante e contacto	Obs 1	300 g/hL
	COBRE 50 SELECTIS	50% cobre (sob a forma de oxicloreto) (WP)	contacto	7	300 a 600 g/hL
	CRUZADO MZ	64% de mancozebe + 8% de metalaxil (WP)	sistémico, contacto e anti-esporulante	28	250 g/hL
	FOLPAXIL AZUL	40% de folpete e 10% de metalaxil (WP)	sistémico, contacto e anti-esporulante	42*	200 g/hL
	FOLPETIS WG	80% de folpete (WG)	contacto	42*	125 g/hL
	MANCOZEBE SELECTIS	80% de mancozebe (WP)	contacto	28	150 a 200 g/hL
	MILGOLD PRO	30% cimoxanil + 22,5% famoxadona (WG)	penetrante e contacto	28	40 g/hL
	MILTANE MICRO WG	75% de mancozebe (WG)	contacto	28	210 g/hL
	MILTRIPLO	3% de cimoxanil + 12,5% de folpete + 12,5% de mancozebe (WP)	penetrante e contacto	56*	400 g/hL
	OXICUPER NOVO	700 g/L de cobre (sob a forma de oxicloreto) (SC)	contacto	21	150 mL/hL
	SENADOR C	6% de dimetomorfe + 40% de cobre (oxicloreto) (WP)	penetrante, contacto e anti-esporulante	28	250 a 300 g/hL
	SENADOR HC NOVO	200 g/L de cobre (hidroxido) + 60 g/L de dimetomorfe (SC)	penetrante, contacto e anti-esporulante	28	300 g/hL
	SENADOR MZ	7,5% de dimetomorfe + 66,7% de mancozebe (WG)	penetrante, contacto e anti-esporulante	28	200 a 250 g/hL
	TAGUS F	7,36% de azoxistrobina + 39,37% de folpete (SC)	penetrante e contacto	28*	150 a 200 ml/hl
	ZETYL COMBI WG	25% de folpete + 50% de fosetil-alumínio (WG)	sistémico e contacto	Obs 1	300 g/hL
	ZETYL MZ	35% de fosetil-alumínio + 35% de mancozebe (WP)	sistémico e contacto	28	350 a 400 g/hL
Black-rot	ARRIOSTA	25% de cresoxime-metilo + 8,75% de penconazol (WG)	sistemico com ação de vapor	35	30 a 40 g/hL
	DECIBEL NOVO	50 % de cresoxime-metilo (WG)	transplaminar com ação de vapor	n.a.	25 a 30 g/hL
	MANCOZEBE SELECTIS	80% de mancozebe (WP)	contacto	28	200 g/hL
	MILTANE MICRO WG	75% de mancozebe (WG)	contacto	28	200 mL/hL
	INVICTUS	250 g/L de difenoconazol (EC)	sistémico	14	12 mL/hL
	TAGUS F	7,36% de azoxistrobina + 39,37% de folpete (SC)	penetrante e contacto	28*	200 mL/hL
	SELECTANE	125g/L de miclobutanil (EC)	sistémico	21	16 a 24 mL/hL
Podridão cinzenta	CARDINAL NOVO	50% de ciprodinil (WG)	sistémico	Obs 3	75 g/hL
Oídio	ALASKA MICRO	80% de enxofre (WG)	contacto e libertação de vapores	-	400 a 1250 g/hL
	ARRIOSTA	25% de cresoxime-metilo + 8,75% de penconazol (WG)	sistemico com ação de vapor	35	30 a 40 g/hL
	DECIBEL NOVO	50 % de cresoxime-metilo (WG)	transplaminar com ação de vapor	n.a.	25 a 30 g/hL
	FLOR DE OURO 98,5%	98,5% de enxofre (DP)	contacto e libertação de vapores	-	10 a 50 kg/ha
	INVICTUS	250 g/L de difenoconazol (EC)	sistémico	14	12 mL/hL
	PENCOL	100g/L de penconazol (EC)	sistémico	14	35 mL/hL
	SELECTANE	125g/L de miclobutanil (EC)	sistémico	21	16 a 24 mL/hL
	TEBUTOP GOLD	250g/L de tebuconazol (EW)	sistémico	14	40 a 60 ml/ hL
Áltica	PETRA	25 g/L de deltametrina (EC)	contacto e ingestão	7	30 a 50 mL/hL
Ácaros Tetraniquídeos	VIRIATO	10% de hexitiazox (WP)	contacto	21	50 g/hL
	RONDA	18 g/L de abamectina (EC)	contacto e ingestão	10	50 a 100 mL/hL
Cicadelas	AVAUNT	150 g/L de indoxacarbe (EC)	contacto e ingestão	Obs 1	25 mL/hL
	PETRA	25 g/L de deltametrina (EC)	contacto e ingestão	7	30 a 50 mL/hL
	RUFAST AVANCE	75 g/L de acrinatrina (EW)	contato e ingestão	21	20 mL/hL
Cicadelídeo da Flavescência Dourada	ATLAS	100 g/L de lambda-cialotrina (CS)	contacto e ingestão	7	17,5 mL/hL
	RUFAST AVANCE	75 g/L de acrinatrina (EW)	contato e ingestão	21	20 mL/hL
Traça	AVAUNT	150g/L de indoxacarbe (EC)	contacto e ingestão	Obs 1	25 mL/hL
	ATLAS	100 g/L de lambda-cialotrina (CS)	contacto e ingestão	7	17,5 mL/hL
	PETRA	25 g/L de deltametrina (EC)	contacto e ingestão	7	40 a 60 mL/hL
Piral	AVAUNT	150g/L de indoxacarbe (EC)	contacto e ingestão	Obs 1	25 mL/hL
	ATLAS	100 g/L de lambda-cialotrina (CS)	contacto e ingestão	7	7,5 mL/hL
Mosca do Mediterrâneo	ATLAS	100 g/L de lambda-cialotrina (CS)	contacto e ingestão	7	12,5 mL/hL
Desladroamento	SHARK	60g/L de carfentrazona-etilo (ME)	contacto não seletivo	21	0,3 L/hL
Molhante	ABION E	346 g/L de parafina (EW)	molhante	-	30 mL/hL

* Apenas em uvas para vinificação · **Obs. 1** - 28 dias em uvas de mesa; 56 dias em uvas para vinificação · **Obs. 2** - 3 dias em uvas de mesa; 10 dias em uvas para vinificação · **Obs. 3** - 7 dias em uvas de mesa; 14 dias em uvas para vinificação

n.a. - não aplicável, coberto pela época de aplicação

Esteja legalmente informado acerca da correta utilização de produtos fitofarmacêuticos. Nesta tabela não consta o número máximo de aplicações por produto fitofarmacêutico / finalidade, bem como outras exigências legais, pelo que recomendamos a leitura atenta dos rótulos.