



KRAFT ADVANCE

INSETICIDA

1L/5L

FORMULAÇÃO ESTABILIZADA

Formulação: Emulsão óleo em água com 18 g/L ou 1,78% (p/p) de abamectina

Grupo químico: Avermectina

APV: 3984

Classificação DPD:

Nocivo; Perigoso para o ambiente

Classificação CLP: ATENÇÃO



Classificação ADR: UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém Substância activa), 9, III, 3 (E)

Características

Insecticida e Acaricida com amplo espectro de acção, o **Kraft Advance** é um produto de origem natural com modo de acção original sobre todos os estados móveis.

Penetrante com actividade translaminar, formando uma reserva efectiva no interior das folhas.

Eficaz sobre ácaros resistentes aos acaricidas e insecticidas tradicionais: piretróides, carbamatos e organofosforados. Excelente selectividade para as culturas e elevada persistência de acção.

Condições de Aplicação

CULTURA	PRAGA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
MACIEIRA	Ácaros eriofídeos (<i>Aculus schlechtendali</i>) e aranhaço vermelho (<i>Panonychus ulmi</i>)	75 ml de KRAFT ADVANCE + 250 ml/hl de um produto contendo 80% de Óleo de Verão.	Efectuar as aplicações após a queda das pétalas, assim que existirem 2 a 3 formas móveis por folha (em média). Não efectuar tratamentos consecutivos nem mais do que 2 aplicações por ano.	14 dias
PEREIRA	Psila (<i>Psilla piri</i>)	75 ml de KRAFT ADVANCE + 250 ml/hl de um produto contendo 80% de Óleo de Verão.	Aplicar ao aparecimento da praga, após a queda das pétalas. Repetir em caso de necessidade. Para evitar o aparecimento de resistências, não efectuar aplicações consecutivas e realizar apenas 2 tratamentos por ano.	14 dias
CITRINOS	Mineira das folhas dos rebentos dos citrinos (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	40 ml de KRAFT ADVANCE + 250 ml/hl de um produto contendo 80% de Óleo de Verão.	Aplicar aos primeiros sinais de ataque nas folhas dos rebentos novos em crescimento. Dirigir a pulverização para os rebentos com folhas jovens, molhando bem as folhas ainda em desenvolvimento. Realizar no máximo 3 tratamentos, com intervalos de 14 dias.	7 dias
TOMATEIRO	Larva mineira (<i>Liriomyza</i> spp.)	60 ml/hl	Aplicar ao aparecimento das primeiras minas nas folhas. Repetir em caso de necessidade. Para evitar o aparecimento de resistências, não aplicar o KRAFT ADVANCE consecutivamente mais de 2 vezes, ou não realizar mais de 4 tratamentos durante o ciclo da cultura.	3 dias

CULTURA	PRAGA	DOSE	APLICAÇÃO	IS
MORANGUEIRO	Ácaros (Phytonemus pallidus, Tetranychina harti, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus turkestanii e Brevipalpus obovatus)	80 - 100 ml/hl	No caso dos ácaros tetraniquídeos, realizar a 1ª aplicação quando se encontram menos de 5 formas móveis por folíolo. Para os restantes ácaros, tratar ao aparecimento dos sintomas. Para evitar o aparecimento de resistências, não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas, nem mais de 4 ao longo do ciclo vegetativo da cultura.	3 dias
ROSEIRAS, CRISÂNTEMOS, CRAVEIROS e ORQUÍDEAS	Ácaros tetraniquídeos	25 - 50 ml/hl	Aplicar ao aparecimento ou em presença das primeiras formas móveis da praga. Para evitar o aparecimento de resistências não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas, nem mais de 4 por ano.	–
CRISÂNTEMOS, GERBERAS e GIPSOFILAS	Larva mineira (Liriomyza spp.)	25 - 50 ml/hl	Aplicar ao aparecimento das primeiras minas nas folhas. Repetir em caso de necessidade. Para evitar o aparecimento de resistências, não efectuar mais que 2 aplicações consecutivas, nem mais de 4 aplicações por ano.	–

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

abamectina – 0,02 em tomate; 0,01 em maçã, pêra e citrinos; 0,1 em morango.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecção Integrada emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.