



MARQUI®

HERBICIDA

1 L / 5 L / 20 L / 200 L

UMA BOA ESCOLHA!

Formulação: Solução concentrada contendo 360 g/l ou 31% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal de isopropilamónio)

Grupo químico: Aminoácido

AV: 0061

Classificação ADR: UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém glifosato), 9, III, 3 (E)

Classificação CLP:



Características

O **MARQUI®** é um herbicida não selectivo de acção sistémica para o controlo de infestantes anuais e vivazes. Permitido antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira directa mas sempre antes da emergência da cultura. Culturas: vinha, pomares de amendoeiras, aveleiras, bananeiras, cerejeiras, limoeiros, laranjeiras, tangerineiras e clementinas, damasqueiros, macieiras, pereiras, pessegueiros, oliveira e o rabo-de-raposa na cultura da faveira.

Outras finalidades: Pousios, renovação de pastagens, zonas não cultivadas/vias de comunicação (áreas industriais, arruamentos, caminhos, bermas de estradas, campos de aviação, campos de jogos, cemitérios, vias férreas).

Condições de Aplicação

CULTURA	ALVO	APLICAÇÃO
VIDEIRA, AMENDOEIRA, AVELEIRA, BANANEIRA, CEREJEIRA, LIMOEIRO, LARANJEIRA, TANGERINEIRA E CLEMENTINA, DAMASQUEIRO, MACIEIRA, PEREIRA, PESSEGUEIRO, NECTARINA E OLIVEIRA	Infestantes anuais e vivazes	Controlar as infestantes anuais monocotiledóneas e dicotiledóneas nas primeiras fases de desenvolvimento e as vivazes desde as primeiras fases de desenvolvimento até à floração. Máximo de 1 tratamento por ano e por ciclo cultural, com este ou outro produto, que contenha glifosato. Todas as espécies fruteiras: usar um equipamento de aplicação apropriado de modo a evitar o arrastamento da calda. Em oliveira, não pulverizar com azeitonas caídas e não colher as azeitonas caídas no solo tratado.
FAVEIRA	Infestantes anuais e vivazes	Controlar as infestantes anuais e Orobanché spp. (rabo-de-raposa), com aplicações efectuadas após a colheita, antes da sementeira da cultura. Máximo de 1 tratamento por ano e por ciclo cultural, com este ou outro produto, que contenha glifosato.
POUSIOS, RENOVAÇÃO DE PASTAGENS, ANTES DA INSTALAÇÃO DAS CULTURAS*, SEMENTEIRA DIRECTA*, ZONAS NÃO CULTIVADAS/VIAS DE COMUNICAÇÃO	Infestantes anuais e vivazes	ZONAS NÃO CULTIVADAS/VIAS DE COMUNICAÇÃO: Áreas industriais, arruamentos, caminhos, bermas de estradas, campos de aviação, campos de jogos, cemitérios e vias férreas. Controlar as infestantes vivazes desde as primeiras fases de desenvolvimento até à floração.

Infestantes suscetíveis e doses de aplicação

INFESTANTES SUSCETÍVEIS	DOSE	INFESTANTES SUSCETÍVEIS	DOSE
ANUAIS *	2 – 4 L/ha	VIVAZES	
VIVAZES		<i>Junça (Cyperus rotundus)</i>	6 – 8 L/ha
<i>Erva-pata (Oxalis-pes-caprae)</i>	4 – 5 L/ha	<i>Juncinha (Cyperus esculentus)</i>	
<i>Escalracho (Panicum repens)</i>	4 – 7 L/ha	<i>Rabo-de-raposa (Orobancha spp.)</i>	0,13 L/ha
<i>Graminhão (Paspalum paspalodes)</i>		<i>Feto (Pteridium aquilinum) **</i>	
<i>Urtigas (Urtica spp.)</i>	5 – 8 L/ha	<i>Acácias (Acacia spp.)</i>	6 – 8 L/ha
<i>Corriola (Convolvulus arvensis)</i>		<i>Gramma (Cynodon dactylon)</i>	
<i>Silvas (Rubus spp.)</i>			

Em manchas de infestantes fazer aplicações localizadas com caldas de 1,5%.

* Antes da instalação de culturas e em técnicas de sementeira direta, mas sempre antes da emergência da cultura, para o controlo de infestantes anuais nas primeiras fases de desenvolvimento também podem ser usadas as doses de 0,75 a 1,5 L/ha de MARQUI®.

** No combate aos fetos fazer as aplicações quando todas as folhas estiverem bem abertas e ainda verdes.

Intervalo de Segurança – 7 dias em amendoeira e aveleira; 28 dias em bananeira, cerejeira, limoeiro, laranja, tangerineira e clementina, damasqueiro, macieira, oliveira, pereira, pessegueiro, nectarina, ameixeira, ginjeira, videira e Kiwi.

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

glifosato – 1 em azeitona; 0,5 em uva, laranja, clementina e tangerinas; 0,1 em banana, cereja, amêndoa, avelã, maçã, pera, pêsego, limão, damasco e nectarina.

Estes LMR não excluem a consulta do site da comissão europeia EU Pesticide database – [Currente MRL Values](#)

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.