



selectis

AQUI À MÃO

www.selectis.pt



Edição I-G-2020

PROTEÇÃO DOS CITRINOS SOLUÇÕES SELECTIS

selectis
AQUI À MÃO

SOLUÇÕES SELECTIS PARA A PROTEÇÃO DA CULTURA DOS CITRINOS

FINALIDADE	PRODUTO	COMPOSIÇÃO	MODO DE AÇÃO	IS (DIAS)	DOSE/ CONCENTRAÇÃO
Infestantes	MARQUI	360g/L de glifosato (SL)	sistémico não seletivo	28	2 a 10 L/ha
	DAKAR PLUS	240 g/L de oxifluorfena (EC)	contacto e residual não seletivo	21	0,6 L/ha
	ALIADO	40 g/L de diflufenicão + 160 g/L de glifosato (SL)	sistémico e residual não seletivo	28	6 a 8 L/ha
	MONARK 125 EC	125 g/L de fluzazifope-P-butilo (EC)	sistémico e selectivo	28	2 a 3 L/ha
	ORFEU	250 g/kg de flazassulfurão (WG)	sistémico, contacto e residual não seletivo	n.a.	60 a 200 g/ha
	SHARK	60g/L de carfentrazona-etilo (ME)	contacto não seletivo	7	0,3 L/ha
	ZENITE	500 g/L de diflufenicão (SL)	residual e contacto não seletivo	n.a.	0,5 a 0,6 L/ha
Míldio	COBRE 50 SELECTIS	50% de cobre (sob a forma de oxicloreto) (WP)	contacto	7	300 a 600 g/hL
	OXICUPER NOVO	700 g/L de cobre (sob a forma de oxicloreto) (SC)	contacto	15	125 mL/hL
	FOSLETIS 80 WG	74,6% de fosetil (sal de alumínio) (WG)	sistémico	15	250 g/hL
Alternariose	COBRE 50 SELECTIS	50% de cobre (sob a forma de oxicloreto) (WP)	contacto	7	300 a 600 g/hL
Gomose	FOSLETIS 80 WG	74,6% de fosetil (sal de alumínio) (WG)	sistémico	15	250 g/hL
Pinta Negra ou Queimado	COBRE 50 SELECTIS	50% de cobre (sob a forma de oxicloreto) (WP)	contacto	7	300 a 600 g/hL
	OXICUPER NOVO	700 g/L de cobre (sob a forma de oxicloreto) (SC)	contacto	15	125 mL/hL
Ácaros	RONDA	18 g/L de abamectina (EC)	contacto e ingestão	10	40 mL/hL
	KRAFT ADVANCE	18 g/L de abamectina (EW)	contacto e ingestão	10	80 mL/hL
	VIRIATO	10% de hexitiazox (WP)	contacto e ingestão	14	10 a 15 g/hL
Cochonilhas	KLIK EXTRA	790 g/L de óleo parafínico (EC)	contacto	-	1 a 2 L/hL
	BAIKAL 501	100 g/L de piriproxfena (EC)	contacto e ingestão	35	50 a 75 mL/hL
Mosca do Mediterrâneo	ATLAS	100 g/L de lambda-cialotrina (CS)	contacto e ingestão	7	12,5 mL/hL
	MAGNET MED NOVO	10 mg de deltametrina (RB)	contacto e ingestão	-	50 a 75 iscos /ha
Mineira das folhas	KRAFT ADVANCE	18 g/L de abamectina (EW)	contacto e ingestão	10	80 mL/hL
	RONDA	18 g/L de abamectina (EC)	contacto e ingestão	10	40 mL/hL
Desladramento	SHARK	60g/L de carfentrazona-etilo (ME)	contacto não seletivo	7	0,3 L/hL
Molhante	ABION E	346 g/L de parafina (EW)	molhante	-	20 mL/hL

n.a. : não aplicável, coberto pela época de aplicação

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

Deverá calibrar-se o equipamento de acordo com o volume de calda a aplicar por hectare. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações e as doses indicadas.

Conheça corretamente o débito do pulverizador (L/min), a velocidade de avanço e a largura de trabalho da barra de pulverização. Efetue os cálculos necessários para que seja possível cumprir as doses de produto fitofarmacêutico a aplicar por hectare. Para que seja possível a uniformidade da distribuição da calda tenha especial atenção à uniformidade do débito de cada bico de pulverização.

