



# INFINOR<sup>®</sup> MIX

HERBICIDA

1 L / 5 L / 20 L / 100 L

## EXCELENTE DESEMPENHO EM PRÉ-EMERGÊNCIA

**Formulação:** Suspo-emulsão (SE) contendo 312,5 g/L ou 28,67 % (p/p) de S-metolaclo-ro e 187,5 g/L ou 17,2 % (p/p) de terbutilazina.

**Grupo químico:** Cloroacetanilida e 1-3-5-triazina

**AV: 1499**

**Classificação ADR:** UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém s-metolaclo-ro e terbutilazina), 9, III, 3 (E)

**Classificação CLP:** ATENÇÃO



### Características

O INFINOR<sup>®</sup> MIX é um herbicida residual e sistêmico, indicado para o controlo de infestantes gramíneas e de folha larga na cultura do milho. Apresenta absorção radicular e foliar e inibe a divisão celular e a fotossíntese nas plantas suscetíveis, ao nível do fotossistema II (inibindo a atividade da proteína D1).

### INFESTANTES SUSCETÍVEIS

PRÉ-EMERGÊNCIA: moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), catassol (*Chenopodium album*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), beldroega (*Portulaca oleracea*), erva-moira (*Solanum nigrum*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*), bardana-menor (*Xanthium strumarium*), Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), milhã (*Setaria* sp.).  
PÓS-EMERGÊNCIA: moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), catassol (*Chenopodium album*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), milhã (*Digitaria* sp.), beldroega (*Portulaca oleracea*), erva-moira (*Solanum nigrum*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*); bardana-menor (*Xanthium strumarium*), Sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), milhã (*Setaria* sp.).

### INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

PRÉ-EMERGÊNCIA: malvão (*Abutilon theophrasti*), milhã (*Digitaria* sp.).  
PÓS-EMERGÊNCIA: malvão (*Abutilon theophrasti*).

### Condições de Aplicação

CULTURA	ALVO	DOSE	APLICAÇÃO
MILHO	Infestantes gramíneas e dicotiledóneas	3,5 L/ha	Aplicar em pré-emergência da cultura, sobre o terreno preparado para a sementeira, no intervalo de tempo que decorre entre a sementeira e a emergência da cultura, mas antes da emergência das infestantes. (BBCH00-09). Regar para incorporar o produto no solo, a não ser que chova nos primeiros dias após o tratamento. Após aplicação do herbicida não se deve mexer a terra.
			Aplicar em pós-emergência precoce da cultura (até às 4 folhas), mas antes da emergência das infestantes. (BBCH10-14). Regar para incorporar o produto no solo, a não ser que chova nos primeiros dias após o tratamento. Após aplicação do herbicida não se deve mexer a terra.

### LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

S-metolaclo-ro – 0,05 em milho. terbutilazina – 0,1 em milho.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas actualizadas emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.