



INFINOR®

HERBICIDA

250 mL / 5 L

SOLUÇÃO DE PRÉ-EMERGÊNCIA COM EFEITO RESIDUAL

Formulação: Concentrado para emulsão (EC) com 960 g/L ou 86,5% (p/p) de s-metolaclo-ro

Grupo químico: Cloroacetanilida

AV: 2040

Classificação ADR: UN 3082

Documento de Transporte - UN 3082, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A., (Contém s-metolaclo-ro), 9, III, 3 (E)

Classificação CLP: ATENÇÃO



Características

O INFINOR® é um herbicida residual com atividade sistêmica composto por 960 g/L de S-metolaclo-ro. Pertencente à família das cloroacetanilidas (Grupo 15 do HRAC), o S-metolaclo-ro tem absorção foliar e radicular atuando na inibição da formação de ácidos gordos de cadeia longa, interrompendo a divisão celular e o consequente desenvolvimento aéreo das plantas suscetíveis.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

milhã-verde (*Setaria viridis*), milhã-amarela (*Setaria glauca*), milhã-painço (*Setaria italica*), milhã-verticilada (*Setaria verticillata*), *Setaria* sp., milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), beldroega (*Portulaca oleracea*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCEPTÍVEIS

juncinha (*Cyperus esculentus*), junça-de-conta (*Cyperus rotundus*), moncos-de-peru (*Amaranthus retroflexus*).

INFESTANTES RESISTENTES

malvão (*Abutilon theophrasti*), catassol (*Chenopodium album*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), erva-moira (*Solanum nigrum*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*).

Condições de Aplicação

CULTURA	INFESTANTES	DOSE L/ha	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	INTERVALO DE SEGURANÇA
MILHO	Infestantes gramíneas e dicotiledóneas	1 – 1,5	Aplicar em pré-emergência da cultura (após a sementeira) (BBCH 00-07), antes da emergência das infestantes.	-
BETERRABA	Infestantes gramíneas e dicotiledóneas	0,5 – 1	As doses mais baixas destinam-se a solos leves ou fracamente infestados e as doses mais elevadas destinam-se a solos pesados, fortemente infestados e para combate a infestantes moderadamente suscetíveis.	-
BATATEIRA	Infestantes gramíneas e dicotiledóneas	1 – 1,5		-

CULTURA	INFESTANTES	DOSE L/ha	VOLUME DE ÁGUA E DOSE DO PRODUTO	INTERVALO DE SEGURANÇA
TOMATEIRO (Ar livre)	Infestantes gramíneas e dicotiledóneas	1 – 1,5	Aplicar antes da transplantação guardando um intervalo de 5 a 10 dias entre a aplicação e o transplante, consoante as condições edafo-climáticas; antes da emergência das infestantes. As doses mais baixas destinam-se a solos leves ou fracamente infestados e as doses mais elevadas destinam-se a solos pesados, fortemente infestados e para combate a infestantes moderadamente suscetíveis.	-

LMR - Limites Máximos de Resíduos (mg/Kg):

S-metolaclo-ro – 0,05 em milho, batata, tomate e beterraba.

Esta informação não dispensa a leitura atenta do rótulo nem a consulta das listas atualizadas, emitidas pela DGAV, assim como, todas as suas orientações em relação à utilização e manuseamento de produtos fitofarmacêuticos.